

Sposób przygotowania się do badania USG jamy brzusznej.

Należy pamiętać aby przed wykonaniem badania USG jamy brzusznej zastosować się do poniższych wskazówek, które pozwolą lekarzowi wykonującemu badanie uzyskać wyraźniejszy obraz i lepszą ocenę narządów, które znajdują się w jamie brzusznej:

- 1. Należy na 2-3 dni przed nadaniem zacząć zażywać Espoticon lub Espumisan, stosować trzy razy dziennie po dwie kapsułki. Powyższe leki są dostępne w aptekach bez recepty.**
- 2. Na dzień przed badaniem należy:**
 - nie spożywać pokarmów wzdymających i ciężkostrawnych a także napojów gazowanych
 - ostatni posiłek należy spożyć nie później niż o godz. 19-tej
 - należy zażywać Espoticon lub Espumisan po posiłku porannym, popołudniowym oraz wieczornym
 - osoby ze skłonnością do zaparć a także osoby otyłe powinny zastosować środki przeczyszczające, ale nie później niż 24 godziny przed badaniem. Należy przy tym pamiętać, że środkiem przeczyszczającym nie może być lewatywa.
- 3. W dniu przeprowadzanych badań należy:**
 - zażyć rano dwie kapsułki Espumisanu lub Espoticonu
 - na badanie zgłosić się na czczo
 - nie pić kawy
 - nie palić papierosów
 - nie rzuć gumy
 - jeżeli badanie odbywa się po godz. 14-tej należy najpóźniej do godz. 8:00 zjeść bułkę z masłem i wypić gorzką herbatę
 - jeżeli pacjent miał już wcześniej wykonywane badania USG powinien przynieść ich wynik ze sobą.
- 4. Przy wykonywanym badaniu pęcherza moczowego, gruczołu krokowego i narządu rodowego należy:**
 - na 1-2 godzin przed badaniem wypić ok. 1 litra niegazowanego płynu
 - na badanie zgłosić się z pełnym pęcherzem.